

Problem 1.)

Consider the Kepler problem that is described by the Hamiltonian

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}.$$

- a.) Consider the following vector (it is called the Runge-Lenz vector)

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - m \alpha \mathbf{e}_r.$$

Express the components of that vector so, that only the components of the canonical momentum and position vectors are used.

- b.) Determine the Poisson bracket $[A_i, H]$. What does it tell about the vector A?

- c.) Using the conservation of A, derive the particle's orbital.

To do so consider an orbital that is in the x-y plane and the vector A points in the x direction. (We can always choose a coordinate system where this is true.) Express the scalar product $\mathbf{A} \cdot \mathbf{r}$ using polar coordinates (r, ϕ) and then using trivial algebra express the orbital.

- d.) What does the direction of A mean? What is its length?

Problem 2.)

A particle of mass m can move in the x-y plane where a conservative $V(x,y)$ potential is also present.

- a.) Write down the Lagrangian of the system and determine the Hamiltonian as a function of p_x, p_y, x and y .
- b.) Write down the Lagrangian of the system using the r and ϕ polar coordinates- ($x = r \cos \phi$, $y = r \sin \phi$)
- c.) Determine the Hamiltonian of the system as a function of p_r, p_ϕ, r and ϕ . Show that this „new” Hamiltonian (denoted by K) is equal to the „old” Hamiltonian, one only needs to change the variables.
- d.) Express the canonical momenta p_x és p_y as functions of p_r, p_ϕ, r és ϕ .
- e.) Show that the Poisson brackets between the variables $\{x, y, p_x, p_y\}$ don't change if we calculate them using the polar version of the canonical coordinates.
- f.) Show that in the case of a central potential ($V=V(r)$) p_ϕ is a conserved quantity.

Problem 3.)

A particle of mass m can move in the x-y plane where a conservative $V(x,y)$ potential is also present.


- a.) Write down the Lagrangian of the system and determine the Hamiltonian as a function of p_x, p_y, x and y .
- b.) We would like to transform to the rotating frame. The transformation is described by
- $$x(t) = X(t) \cos(\omega t) - Y(t) \sin(\omega t)$$
- $$y(t) = X(t) \sin(\omega t) + Y(t) \cos(\omega t)$$
- Write down the Lagrangian in the X, Y variables.
- c.) Determine the „new” Hamiltonian K as a function of X, Y, P_X és P_Y . What is the connection between the „new” and the „old” Hamiltonian?
- d.) Show that the Poisson brackets between the variables $\{x, y, p_x, p_y\}$ don't change if we calculate them using the new canonical coordinates $\{X, Y, P_X, P_Y\}$.

Problem 4.)

You studied some important algebraic properties of the Poisson brackets,

- $[F, G] = -[G, F]$
- $[F, aG + bD] = a[F, G] + b[F, D]$, where a and b are real numbers.
- $[F, GD] = G[F, D] + [F, G]D$
- Jacobi identity $[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$

The proof of the first three relations is trivial, but the fourth is quite complicated. By making use of the symplectic matrix J prove the Jacobi identity. Use the antisymmetric property of J .

Problem 5.)

A wire track is fixed to a cylinder (see Figure). A small body of mass m can move without friction on the track. The moment of inertia of the cylinder is Θ , and it can rotate around its axis. The position of the system is described by the rotation angle φ of the cylinder and the position α of the body. The gravitational force acts on the body.

The coordinates x, y, z of the small body is described by

$$x = R \sin \alpha$$

$$y = -R \cos \alpha,$$

$$z = C(\alpha - \varphi)$$

where C is the vertical slope of the track.

a.) Construct the Lagrangian of the system.

b.) Determine the canonical momenta p_α and p_φ .

c.) The angular momentum of the system is $N = mR^2 \frac{d\alpha}{dt} + \Theta \frac{d\varphi}{dt}$.

Express it as a function of p_α and p_φ .

d.) In the lecture you learned that conserved quantities generate symmetries. What symmetry is generated by N ?

Problem 6.)

The Hamiltonian of a two-dimensional isotropic harmonic oscillator reads as

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 (x^2 + y^2).$$

a.) In practice Pr8/2-es you have shown that the elements of the following 2x2 matrix are conserved quantities

$$A_{ij} = \frac{1}{2m} (p_i p_j + m^2 \omega^2 r_i r_j)$$

Repeat the calculations of the homework and show that these quantities are indeed conserved.

b.) What kind of symmetry is generated by the elements of the matrix A ?

c.) Introduce the following quantities:

$$S_1 = \frac{A_{12}}{\omega}, \quad S_2 = \frac{A_{22} - A_{11}}{2\omega}, \quad S_3 = \frac{L}{2} = \frac{1}{2} (xp_y - yp_x)$$

Show that their Poisson brackets are $[S_i, S_j] = \varepsilon_{ijk} S_k$.

d.) Show that $H^2 = 4\omega^2 (S_1^2 + S_2^2 + S_3^2)$!

1.) Feladat

Tekintsük a Kepler-problémát, aminek Lagrange-függvénye

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}.$$

e.) Tekintse az alábbi vektort (a neve Runge-Lenz vektor):

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - m \alpha \mathbf{e}_r.$$

Fejezze ki ezen vektor komponenseit úgy, hogy benne csak a kanonikus hely és impulzus komponensek szerepeljenek!

f.) Számítsa ki az $[A_i, H]$ Poisson-zárójelet! Mit mondhatunk ez alapján az \mathbf{A} vektorról?

g.) Az \mathbf{A} vektor megmaradását kihasználva fejezzük ki (a mechanika 1 tárgyon látott effektív potenciálos módszernél sokkal egyszerűbben) a keringő bolygó pályáját!

Ehhez tekintsünk egy olyan ahol a pálya síkja az x - y sík, és az \mathbf{A} vektor mutasson az x irányba. Fejezzük ki az $\mathbf{A} \cdot \mathbf{r}$ skaláris szorzatot az (r, ϕ) polárkoordináták segítségével, majd rendezzük megfelelően a kapott kifejezést és olvassuk le a pályát!

h.) Milyen irányba mutat az \mathbf{A} vektor? Mit fejez ki a hossza?

2.) Feladat

Egy tömegpont az x - y síkon mozoghat a $V(x,y)$ potenciális energiával jellemzett konzervatív erőterben.

g.) Írja fel a rendszer Lagrange-függvényét majd ebből vezesse le a Hamilton függvényt, mint p_x, p_y, x és y függvényét!

h.) Írja fel a rendszer Lagrange-függvényét úgy, hogy a tömegpont helyzetét az r és ϕ síkbeli polárkoordinátákkal írjuk le. ($x = r \cos \phi$, $y = r \sin \phi$)

i.) Vezesse le a rendszer Hamilton-függvényét mint p_r, p_ϕ, r és ϕ függvényét! Mutassa meg, hogy az új (K-val jelölt) Hamilton függvény egyenlő a régi H-val, csak benne változcserét kell végrehajtani.

j.) Fejezze ki az x és y Déscartes koordinátákhoz rendelt p_x és p_y kanonikus impulzusokat p_r, p_ϕ, r és ϕ segítségével!

k.) Mutassa meg, hogy az $\{x, y, p_x, p_y\}$ változók közötti kanonikus Poisson-zárójelek nem változnak, ha azokat a polár-koordinátarendszer kanonikus koordinátaival és impulzusaival számítjuk ki!

l.) Mutassa meg, hogy centrális potenciál ($V=V(r)$) esetén a p_ϕ időállandó!

3.) Feladat

Egy tömegpont az x - y síkon mozoghat a $V(x,y)$ potenciális energiával jellemzett konzervatív erőterben.

e.) Írja fel a rendszer Lagrange-függvényét majd ebből vezesse le a Hamilton függvényt, mint p_x, p_y, x és y függvényét!

f.) Át szeretnénk térni forgó koordinátarendszerbe, azaz a következő változókra:

$$x(t) = X(t) \cos(\omega t) - Y(t) \sin(\omega t)$$

$$y(t) = X(t) \sin(\omega t) + Y(t) \cos(\omega t)$$

Írja fel a Lagrange-függvényt az X és Y változóknál!

g.) Határozzuk meg az új K Hamilton függvényt az X, Y, P_X és P_Y függvényében! Hogy viszonyul ez az álló koordinátarendszer-beli koordinátákkal kifejezett Hamilton-függvényhez?

h.) Mutassa meg, hogy az $\{x, y, p_x, p_y\}$ változók közötti kanonikus Poisson-zárójelek nem változnak, ha az új $\{X, Y, P_X, P_Y\}$ kanonikus változók szerint fejezzük ki őket.


4.) Feladat

Az előadásban szerepelt a Poisson zárójel néhány tulajdonsága:

- $[F, G] = -[G, F]$
- $[F, aG + bD] = a[F, G] + b[F, D]$, ahol a, b valós számok
- $[F, GD] = G[F, D] + [F, G]D$
- Jacobi azonosság: $[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$

Ezek közül az első három bizonyítása triviális, a Jacobi azonosság azonban igen komplikált. Használjuk a szimplektikus mátrixos jelölést, és bizonyítsuk a Jacobi azonosságot! Használjuk ki a J szimplektikus mátrix antiszimmetrikus voltát!

5.) Feladat



Egy kör alapú hengerre egy spirál alakú drótpályát cséveltünk, amin egy m tömegű gyöngyszem súrlódás nélkül mozoghat. A henger tehetetlenségi nyomatéka a szimmetriatengelyére Θ , és a tengely körül könnyen (súrlódás nélkül) elfordulhat. A rendszer helyzetét a henger φ elfordulásával és a gyöngyszem α helyzetével írjuk le. A gyöngyszemre hat a külső gravitációs erőter is.

A gyöngyszem x, y, z koordinátáit a két szöggel az alábbi módon tudjuk kifejezni:

$$x = R \sin \alpha$$

$$y = -R \cos \alpha,$$

$$z = C(\alpha - \varphi)$$

Ahol C jelöli a spirál menetemelkedését.

e.) Konstruálja meg a rendszer Lagrange-függvényét!

f.) Fejezze ki a p_α és p_φ kanonikus impulzusokat!

g.) A Gy7/1 házi feladatban Noether tétel segítségével megmutattuk, hogy a rendszer impulzusmomentuma mozgásállandó:

$$L = mR^2 \dot{\alpha} + \Theta \dot{\varphi}$$

Fejezze ki az impulzusmomentumot a p_α és p_φ kanonikus impulzusok segítségével!

h.) Előadásban szerepelt, hogy a mozgásállandók szimmetriatranszformációkat generálnak. Milyen transzformációt generál L ?

6.) Feladat

Egy izotrop harmonikus oszcillátor Hamilton-függvénye az alábbi alakú:

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2)$$

e.) A Gy7/2-es feladatban megmutattuk, hogy az alábbi 2x2-es szimmetrikus mátrix elemei megmaradó mennyiségek:

$$A_{ij} = \frac{1}{2m} (p_i p_j + m^2 \omega^2 r_i r_j)$$

Ismételjük meg a HF számításait, mutassuk meg, hogy valóban megmaradó mennyiségekről van szó!

f.) Milyen szimmetria transzformációkat generálnak az egyes mátrixelemek?

g.) Vezessük be az alábbi mennyiségeket:

$$S_1 = \frac{A_{12}}{\omega}, \quad S_2 = \frac{A_{22} - A_{11}}{2\omega}, \quad S_3 = \frac{L}{2} = \frac{1}{2}(xp_y - yp_x)$$

Mutassuk meg, hogy $[S_i, S_j] = \varepsilon_{ijk} S_k$.

h.) Mutassuk meg, hogy $H^2 = 4\omega^2(S_1^2 + S_2^2 + S_3^2)$!