

A17.) feladat

Egy egy szabadsági fokú mechanikai rendszer Hamilton-függvénye az alábbi alakú:

$$H = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{q^2} + p^2 q^4 \right)$$

Szeretnénk egy kanonikus transzformációt végrehajtani, aminek alkotófüggvénye „2”-es típusú:

$$W_2(q, P) = \frac{P}{q}$$

- Az alkotófüggvény megfelelő deriváltjai segítségével adja meg a $p(q,P)$ és $Q(q,P)$ összefüggéseket!
- Az a.) feladatban kapott összefüggések segítségével adja meg a „rég” kanonikus koordinátákat az „új” függvényében, azaz adja meg a $q(Q,P)$ és $p(Q,P)$ összefüggéseket!
- Adja meg az új $K(Q,P)$ Hamilton függvényt!
- Írja fel a $K(Q,P)$ Hamilton-függvény segítségével a kanonikus mozgásegyenleteket az új változókra!
- Adja meg a mozgásegyenletek $Q(t)$ és $P(t)$ megoldását!
- Transzformáljon vissza a régi koordinátákba, azaz a $Q(t)$ és $P(t)$ ismeretében adja meg a $q(t)$ és $p(t)$ függvényeket!

A18.) feladat

Adott az alábbi transzformáció, ami a q - p fázissík koordinátatengelyeit forgatja el:

$$Q = q \cos \alpha - p \sin \alpha$$

$$P = q \sin \alpha + p \cos \alpha$$

- A $[Q,P]$ Poisson zárójel kiszámításával mutassa meg, hogy a transzformáció kanonikus! Szeretnénk egy $W_2(q,P)$ alkotófüggvényt találni, ami a fenti transzformációt generálja. Ehhez a következőket kell tennie:
 - Alakítsa át a fenti egyenleteket és fejezze ki a $p(q,P)$ és $Q(q,P)$ függvényeket!
 - A b.) feladat eredményeiből olvassa le a $\frac{\partial W_2(q,P)}{\partial q}$ és $\frac{\partial W_2(q,P)}{\partial P}$ deriváltakat!
 - Oldja meg a differenciálegyenletet, azaz adjon meg egy megfelelő $W_2(q,P)$ függvényt!

B25.) feladat

Egy egydimenziós harmonikus oszcillátor Hamilton-függvénye megfelelő időegységet választva az alábbi alakba írható:

$$H(p, x) = \frac{p^2}{2} + \frac{x^2}{2}$$

a.) Tekintse az alábbi transzformációt:

$$Q = \frac{x + ip}{\sqrt{2}}$$

$$P = \frac{ix + p}{\sqrt{2}}$$

Poisson-zárójelek segítségével mutassa meg, hogy a transzformáció kanonikus!

b.) Konstruáljon egy „2”-es típusú alkotófüggvényt, ami az a.) feladatban szereplő kanonikus transzformációt generálja.

c.) Adja meg az új $K(Q, P)$ Hamilton függvényt! Írja fel és oldja meg a kanonikus egyenleteket!

d.) Láthatja, hogy az új Hamilton-függvény komplex, és a kanonikus egyenletek megoldásai is komplex értékű függvények. Az eredeti p, x változók viszont valósak, ez alapján mutassa meg, hogy $P = iQ^*$, és azt, hogy a $K(Q, P)$ -ből számolt mozgásegyenletek nem „rontják el” ezt az összefüggést (azaz $\frac{d}{dt} P = i \frac{d}{dt} Q^*$)

e.) Legendre-transzformáció segítségével készítsen „1”-es típusú $W_1(x, Q)$ alkotófüggvényt a b.)-ben kapott $W_2(x, P)$ -ből. Mutassa meg, hogy ez is ugyanazt a transzformációt generálja!

B26.) feladat

Tekintse az alábbi transzformációt:

$$Q = q^\alpha \cos \beta p, \quad P = q^\alpha \sin \beta p$$

a.) Számítsa ki a $[Q, P]$ Poisson-zárójelet!

b.) Mekkora α -t és β -t ha azt szeretnénk, hogy a transzformáció kanonikus legyen?

c.) Vegye a két egyenlet hányadosát, és ezzel fejezze ki a $Q(p, P)$ összefüggést!

d.) „4”-es típusú $W_4(p, P)$ alkotófüggvényt keresünk a transzformációnak. A c.)-ben kapott kifejezés (megfelelő előjellel vett) integráljából fejezze ki W_4 -et!

B27.) feladat

Egy kétdimenziós, elektromosan töltött izotrop harmonikus oszcillátort a rezgési síkjára merőleges irányú homogén B indukciójú mágneses térbe helyeztünk. A rendszer Hamilton-függvénye (az ún. szimmetrikus mértékben felírva) az alábbi:

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_x + \frac{eB}{2} y \right)^2 + \frac{1}{2m} \left(p_y - \frac{eB}{2} x \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2)$$

A feladatban egy elsőre furcsa, de elegáns megoldást adunk a problémára. A megoldás azon az észrevételen alapul, hogy egy forgó koordinátarendszerben a Coriolis-erő éppen olyan alakú, mint egy homogén mágneses tér hatása, ezért azt várjuk, hogy esetünkben áttérve megfelelő szögsebességgel forgó koordinátarendszerbe a mágneses tér hatását kitranszformálhatjuk, és így egy egyszerű izotrop harmonikus oszcillátort nyerünk.

a.) Gyakorlaton meghatároztuk az áttérés alkotófüggvényét, ami „2”-es típusú, és az alábbi alakú:

$$W_2(x, y, P_x, P_y, t) = x(P_x \cos \Omega t - P_y \sin \Omega t) + y(P_x \sin \Omega t + P_y \cos \Omega t)$$

Az alkotófüggvény megfelelő deriváltjainak segítségével fejezze ki a p_x , p_y , X és Y változókat az x, y, P_x, P_y és t függvényében!

- b.) Az a.)-ban a kapott egyenletek átalakításával fejezze ki az új $\{X, Y, P_x, P_y\}$ koordinátákat a régiek $\{x, y, p_x, p_y\}$ segítségével.
- c.) Adja meg a b.)-ben szereplő összefüggések inverzét is, azaz fejezze ki a régi koordinátákat az újak segítségével is!
- d.) Adja meg a $K(X, Y, P_x, P_y)$ új Hamilton-függvényt! Ha jól számolt ez időfüggetlen lesz.
- e.) Mutassa meg, hogy az új K Hamilton-függvény az eredetinek megfelelő alakra hozható, azaz

$$K = \frac{1}{2m} \left(P_x + \frac{eB'}{2} Y \right)^2 + \frac{1}{2m} \left(P_y - \frac{eB'}{2} X \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega'^2 (X^2 + Y^2),$$

ahol B' és ω' az új „effektív” mágneses tér és körfrekvencia. Fejezze ki ezeket a forgó koordinátarendszer Ω szögsebességének, valamint a B , e , m és ω függvényeként.

- f.) Mekkora válasszuk az Ω szögsebességet, hogy a B' effektív mágneses térerősség zérussá váljon? Hogyan néz ki ekkor a K Hamilton-függvény, azaz mekkora az ω' effektív körfrekvencia?
- g.) Oldjuk meg a mozgásegyenleteket abban a forgó rendszerben, ahol a B' effektív térerősség zérus! Tudjuk, hogy itt a részecske ellipszis pályákon keringhet. Mennyi a keringési idő?
- h.) Láthatjuk, ha visszatérünk az eredeti x, y koordinátarendszerbe, az ellipszis pálya nagytengelye Ω szögsebességgel forog. Ábrázoljuk a részecske pályáját!
-

C09.) Feladat

A gyakorlaton (5. Feladat) szerepelt az alábbi Hamilton-függvény, ami egy csillapított oszcillátort ír le:

$$H = \frac{p^2}{2m} e^{-2\alpha t} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 e^{2\alpha t}$$

Az ott felírt („1”-es típusú) alkotófüggvény egy olyan új $K(Q,P)$ Hamilton-függvényt állított elő, ami majdnem egy harmonikus oszcillátor Hamilton-függvénye csak benne a Q és P változók fel vannak cserélve.

Keressen olyan W alkotófüggvényt (bármilyen típusút), ami alapján az új $K(Q,P)$ Hamilton-függvényben még a Q és P is a szokásos oszcillátornak megfelelően szerepel, azaz:

$$K(Q, P) = \frac{1}{2m} P^2 + \frac{m}{2} (\omega_0^2 - \alpha^2) Q^2$$